



Razavi Hospital

بیمارستان رضوی

گروه هدف : بیماران و مراجعین

تصوير الكلية

واحد آموزش سلامت



يلزم الصيام.

- بالنسبة للمرحلة الرئيسية (مع الدواء) يجب الصيام 6 ساعات.
- يجب أن تشرب 3 إلى 4 أكواب من الماء أو السوائل المرغوبة قبل موعدك المقرر، وتخليئة المثانة مباشرة قبل بدء الفحص .
- تأكدوا من إحضار الفحوصات الخاصة بكم كالسونار، التصوير الشعاعي، التصوير المقطعي المحوسب والرنين.
- تأكدي من إبلاغ موظفي القسم إذا كنتي حاملا او تشكين باحتمال الحمل .
- في حالة الرضاعة الطبيعية، توقفي عن الرضاعة الطبيعية لمدة 12 ساعة على الأقل .

1	شماره بازنگری :	منبع : 1-ACR-SPR-SNM PRACTICE GUIDELINE FOR THE PERFORMANCE OF ADULT AND PEDIATRIC RADIONUCLIDE CYSTOGRAPHY, 2010 2-Society of Nuclear Medicine Procedure Guideline for Diagnosis of Renovascular Hypertension, 2003 3-Society of Nuclear Medicine Procedure Guideline for Renal Cortical Scintigraphy in Children
۹۸/۰۷/۱۷	تاریخ بازنگری:	
۹۹/۰۷/۱۷	تاریخ بازنگری مجدد:	
۶۵۰۵۱۰	شماره شناسایی :	کلینیک پرستاری آموزش سلامت (شنبه تا ۵شنبه - از ساعت ۱۰ الی ۱۲) لینک کانال تلگرامی واحد آموزش به بیمار : @Razavi_PE شماره تماس : ۳۶۰۰۴۶۱۲

طب الأطفال) ، ومن الطبيعي أن يشعر المريض ببعض الحرق في مجرى البول بعد إزالة التصوير والقسطرة .

تصوير الكابتوبريل

يتم استخدام تقنية التصوير هذه لتقييم ارتفاع ضغط الدم المقاوم للعلاج. يتم إجراء التصوير خلال يومين ويجب على المريض الالتزام بالشروط التالية.

التحضيرات اللازمة لتصوير كابتوبريل:

- يصوم المريض لمدة 6 ساعات على الأقل لإجراء الفحص.
- عدم اتباع نظام غذائي خال من الملح لمدة يومين قبل الفحص.
- يجب إيقاف مدرات البول قبل 48 ساعة على الأقل من الاختبار.
- التوقف عن الكابتوبريل قبل 3 أيام واناوبريل قبل 5 أيام.
- التوقف عن استخدام أدوية ARB (فالسارتان ، اللوسارتان) قبل ثلاثة أيام.
- التوقف عن استخدام الأدوية التي تحظر البيتتا (بروبرانولكون ...) 12 ساعة قبل الفحص.

طريقة الاجراء:

- يتم التصوير نهارا.
- بالنسبة للمرحلة التي لا تحتوي على كابتوبريل (المرحلة الخالية من الادوية) لا

تصوير الكلية

يتم إجراء فحوصات الكلى بعدة طرق وسيتم إجراؤها لكم بناءً على طلب من قبل طبيبك الذي يطلب إجراء فحص الكلى.

تصوير الكلى (DTPA ، EC)

يتم استخدام تقنية التصوير هذه لتحديد تدفق دم الكلى وانسداد الكلى.

التحضيرات اللازمة لتصوير DTPA

- لا حاجة للصوم.
- يجب أن تشرب 3 إلى 4 أكواب من الماء أو السوائل المرغوبة قبل موعدك المقرر، وتخليئة المثانة مباشرة قبل بدء الفحص.
- لا حاجة لخلع الملابس الشخصية. ولكن يجب التخلص من المعادن كالمفاتيح والعملات المعدنية وغيرها..
- تأكدوا من إحضار الفحوصات الخاصة بكم كالسونار، التصوير الشعاعي، التصوير المقطعي المحوسب والرنين.
- تأكدي من إبلاغ موظفي القسم إذا كنتي حاملًا او تشكين باحتمال الحمل .
- في حالة الرضاعة الطبيعية، توقفي عن الرضاعة الطبيعية لمدة 12 ساعة على الأقل .

طريقة الاجراء:

- يُطلب من المريض استخدام لتر واحد على الأقل من السوائل لتحسين إجراء التصوير (قبل البدء).
- في هذه الطريقة ، يتم حقن مادة مشعة في جسمك ومن ثم تصويرها باستخدام كاميرا للتصوير لمدة 30 إلى 60 دقيقة، طوال هذا الوقت عليكم البقاء ساكنين دون حراك.
- قد يتم إجراء التصوير المتأخر للمريض بناءً على تقدير الطبيب.

تصوير DMSA

هذه التقنية تبين اداء وحدوث التغيرات الناجمة عن مرض انسدادى أو التهاب كليوي سابق.

التحضيرات اللازمة لتصوير DMSA

- لا حاجة للصوم.
- تأكدوا من إحضار الفحوصات الخاصة بكم كالسونار، التصوير الشعاعي، التصوير المقطعي المحوسب والرنين.
- تأكدي من إبلاغ موظفي القسم إذا كنتي حاملًا او تشكين باحتمال الحمل .
- في حالة الرضاعة الطبيعية، توقفي عن الرضاعة الطبيعية لمدة 12 ساعة على الأقل .

طريقة الاجراء:

- يتم حقن مقدار معين من المادة المشعة في الوريد.
- ثم يُطلب من المريض استخدام لتر واحد على الأقل من السوائل لتحسين إجراء التصوير.
- يتم تنفيذ التصوير بعد 1.5 إلى 2 ساعة..

تصوير VCUg

يفحص هذا المسح عودة البول من المثانة إلى الكليتين ومجرى البول.

التحضيرات اللازمة لتصوير VCUg:

- لا حاجة للصوم.
- تأكدوا من إحضار الفحوصات الخاصة بكم.
- تأكدي من إبلاغ موظفي القسم إذا كنتِ حاملًا او تشكين باحتمال الحمل .

طريقة الاجراء:

- يتطلب الفحص من المريض قسطرة ويدخل الدواء في مجرى البول من خلالها ويتم ملئ المثانة به مع كمية معينة من المحلول الملحي الطبيعي.
- يتم إجراء التصوير في مرحلتين: ملئ المثانة وإفراغ المثانة.
- يتم إجراء القسطرة في القسم أو في اقسام اخرى بالتنسيق معه(أمراض النساء ،