



Razavi Hospital

بیمارستان رضوی

گروه هدف : بیماران و مراجعین

التلقيح داخل الرحم

واحد آموزش سلامت



الكشوفات نتائج موجبة يجب مراجعة الطبيب لاتباع الارشادات الطبيّة اللازمة.

صحيّة كاملة لنقله الى داخل الرحم. و ينقل عن طريق الأنايب الناعمة جداً الى عنق الرحم.

الإرشادات الطبيّة و النصائح الصحيّة بعد إجراء العمليّة:

- الرعاية في القسم الخاص بالعيادة بعد العمليّة بمدة ساعة واحدة
- الرعاية في الليلة التالية بعد إجراء العمليّة ثمّ رعاية المريضة كل ليلتين مرّة واحدة في مرحلتين (بين ليلة و ليلة)
- التجنب من أكل الأطعمة المثيرة للغازات و النفخ و الإكثار من أكل الفواكه و الخضراوات
- الاستراحة حتى إعلان نتائج الفحوصات
- التجنب من العوامل المثيرة للقلق و الغضب
- القيام بالكشوفات الطبيّة للدم في اليوم الرابع عشر حتى السادس عشر بعد إجراء العمليّة و إذا اعطت

منبع :	شماره بازنگری :	°
شوهام ۲۰۱۸ - نواک	تاریخ بازنگری:	۹۸/۰۶/۳۰
	تاریخ بازنگری مجدد:	۹۹/۰۶/۳۰
	شماره شناسایی :	۶۵۱۵۰۷

التلقيح داخل الرحم

عندما واجه الزوج بعد مضي سنة مشكلة فى الانجاب رغم عدم استخدام طرق المنع من الحمل فعليه مراجعة الطبيب . فالطبيب الاخصائى يحدد طرق العلاج و كفيته بعد اجراء الفحوصات المخبرية ودراسة نتائج الاختبارات فالتلقيح داخل الرحم من إحدى طرق علاج العقم.

IUI(التلقيح داخل الرحم) من اسهل الطرق لعلاج العقم. تجرى هذه العملية مرّة واحدة الى ثلاث أو اربع مرّات فى كلّ شهرٍ. و إذا لم تنجح العملية أجريت على الزوج سائر طرق العلاج. و نسبة النّجاح فى هذه العملية تبلغ اربعين أو خمسين بالمائة .

متى تستخدم طريقة IUI لعلاج العقم ؟

مشاكل الرجال:

- انخفاض عدد الحيوانات المنوية أو ضعف فى حركتها

- القذف الارتجاعى أو القذف المبكر

- العملية الجراحية و الاصابات

- مضاعفات ادوية خاصّة

- الإصابة ببعض الامراض مثل مرض السكرى و تشوهات الغدد الدرقية

- القصور او الضعف فى العلاقة الحميمة

مشاكل النساء:

- ضيق شديد فى فتحة المهبل

- ضيق عنق الرحم

- العقم لأسباب غير معلومة

مراحل العلاج:

فى البداية يجب إعداد المبايض للإباضة باستخدام الأدوية المحفزة للإباضة و يتمّ ذلك بالشكل الآتى:

- المراجعة الأولى فى اليوم الاول حتى اليوم الثالث لفترة الحيض للسونار (التنظيرالطبي) و وصف الأدوية الخاصّة من قبل الطبيب الأخصائى

- المراجعة الثانية فى التاسع حتى الحادى عشر من فترة الحيض للسونار (التنظيرالطبي) لأجل تعيين مدى استجابة المبايض للأدوية المنشّطة و لحجزموعد المراجعة التالية.

- وصف حقن ابرة HCG على ان تكون المبايض جاهرة لإطلاق البويضة.

- المراجعة للتلقيح داخل الرحم بعد 36 الى 48 ساعات من حقن ابرة HCG .

- الاجتناب من الجماع بعد السونار النهائى

منهج إجراء العملية:

لإجراء هذه العملية يتمّ تحضير عينة من السائل المنوى للزوج قبل إجراء IUI بمدة قصيرة فى المختبر تحت ظروف